

## ***Mus musculus***

Topolino delle case, topo comune, topo domestico, sorcio

Il topolino delle case è un roditore di piccole dimensioni (7-10 cm di corpo, più altrettanti di coda) diffuso praticamente in tutto il mondo.

È una specie tendenzialmente notturna, che può vivere in spazi anche molto ridotti e in gruppi numerosi.

La pelliccia sul ventre è chiara, mentre fianchi e dorso sono grigio/marrone uniforme, ma con un'ampia varietà possibile di gradazioni.

Le orecchie, mobili e attivissime, sono grandi.

Il regime alimentare è onnivoro, sebbene mostri una notevole preferenza per cibi ricchi di amido come semi e cereali. Ha pochissime necessità di acqua in quanto riesce ad utilizzare al meglio quella contenuta nel cibo. Tende a nutrirsi poco, ma spesso.

È una specie molto prolifica caratterizzata da un ciclo vitale assai rapido. I topolini delle case infatti diventano maturi a 6-7 settimane dalla nascita. Le femmine sono fertili ogni 4 giorni e la gravidanza dura attorno alle tre settimane. Ogni nidiata è costituita da 4-9 cuccioli che, alla nascita, sono nudi e ciechi. Lo svezzamento ha luogo in tre settimane. Vivono un anno circa.

È un roditore mite, curioso ma timido ed estremamente reattivo, in grado di correre a grande velocità, saltare per alcune decine di centimetri tanto in distanza quanto in altezza e arrampicarsi come un acrobata in caso di necessità. Le piccole dimensioni gli consentono di passare attraverso pertugi di poco più di un centimetro di diametro.

A livello domestico viene normalmente affrontato con trappole meccaniche a cattura più o meno cruenta, trappole adesive o esche tossiche.



© www.pest2000.it - 2014

*Mus musculus* – Topolino delle case



© www.pest2000.it - 2014

*Mus musculus* – esemplare intento a nutrirsi



*Mus musculus* – esemplari adulti



© www.pest2000.it - 2014

*Mus musculus* – esemplare catturato da una trappola multicattura di tipo incruento